

Médicos Oftalmologistas

Dr. António Sampaio
Dr. António Limão
Dr. João Ilharco
Dr. José Gouveia Roque
Dr. Paulo Graça
Dr. Luís Cardoso
Dr. Armando Garcia
Dr. Silvério Falcão
Dr. Fernando Eusébio
Dr. Paulo Nunes
Dr. Fernando Fernandes
Dr. João Silva Ilharco
Dra. Isabel Prieto
Dra. Rita Flores
Dr. Joaquim Fretes
Dra. Margarida Moreira Pires
Dra. Fátima Laureano
Dr. Paulo Silva Guerra
Dra. Teresa Gomes
Dra. Catarina Pedrosa
Dr. Tiago Morais Sarmento

INSTITUTO DE
MICROCIRURGIA
OCULAR



Torres de Lisboa
Rua Tomás da Fonseca, Torre G
R/c. - CONSULTAS E EXAMES
Torre F - 3º andar - CIRURGIA • 1600 - 209 LISBOA
Tel: 21 722 16 30 • Marcações: 21 722 16 31
www.imo.pt

14/9/23

INFORMAÇÃO CLÍNICA

Ref.: Amanda Garcia Nascimento Jesus

Observado em consulta de 1ª vez no dia 11/9/23, referiu ter perda acentuada de visão, mais acentuada do O.E., com início há cerca de 3 anos, altura em que lhe foi feito o diagnóstico de queratocone bilateral

As acuidades visuais não corrigidas são de 0.1 (um décimo) no O.D. e de contagem de dedos a 50 cm no O.E., não melhorando com correção óptica.

No exame biomicroscópico da córnea observa-se no O.D. ectasia inferior com córnea transparente e no O.E. ectasia com cicatrização central do estroma.

A Tomografia (Pentacam), revela no O.D. a presença de Queratocone Grau IV, com queratometria média de 57.00 D. e no O.E. Queratocone igualmente Grau IV, com queratometria média de 65.50 D.

Devido ao estadio avançado do queratocone, tem indicação para a realização de transplante de córnea (queratoplastia penetrante), em primeiro lugar ao O.E., única terapêutica que poderá conduzir à recuperação da visão.

Foi igualmente indicado o ensaio de lente de contacto escleral para o O.D., para tentar melhorar transitoriamente a visão deste olho, o qual tem também indicação para transplante de córnea.

António Limão
(Médico Oftalmologista)