

Relatório Clínico

A paciente [REDACTED] compareceu a consulta na Clínica Clip e após observação clínica a paciente apresenta edentulismo total superior e edentulismo parcial inferior, com comprometimento significativo da função mastigatória e da estabilidade das próteses removíveis.

Os dentes que ainda tem na zona inferior são dentes com prognóstico muito reservado pois tem caries muito grande e tem indicação clínica para extração, tornando-se no futuro próximo uma paciente com edentulismo total superior e inferior.

Paciente refere também que houve uma fractura do maxilar na zona direita no passado. No momento encontra-se estável mas prejudicando a adaptação da prótese removível e apresentando alguma disfunção temporomandibular.

A análise clínica revelou:

- Perda óssea significativa na região desdentada, resultando na ausência de suporte adequado para uma prótese removível convencional.
- Falta de retenção da prótese, causando instabilidade, desconforto e dificuldade na mastigação.
- Dificuldades fonéticas devido à mobilidade da prótese.
- Comprometimento da oclusão e da distribuição das forças mastigatórias, aumentando o risco de sobrecarga em dentes remanescentes e disfunção temporomandibular.
- Impacto negativo na qualidade de vida, com dificuldades na alimentação e prejuízo ao bem-estar geral do paciente.

Dado que a prótese removível não proporciona retenção adequada, a colocação de implantes dentários é essencial para a reabilitação funcional do paciente. Os implantes irão:

- Restaurar a função mastigatória, permitindo uma alimentação adequada e eficiente.
- Garantir estabilidade e retenção da prótese, eliminando desconforto e insegurança.
- Melhorar a fonética, reduzindo impactos na comunicação do paciente.
- Preservar a estrutura óssea, evitando a reabsorção acelerada que ocorre com o uso prolongado de próteses removíveis.
- Evitar complicações associadas à má adaptação da prótese, como lesões na mucosa e problemas digestivos devido à mastigação ineficaz.

Com base na avaliação clínica, conclui-se que a reabilitação com implantes dentários é a única alternativa viável para restaurar a função mastigatória e promover qualidade de vida ao paciente. O tratamento com prótese removível não é indicado devido à ausência de retenção e ao comprometimento funcional resultante.

Atenciosamente,

Carlota Alves de Barros
(OMD 12256)